

颈神经或腰神经神经根鞘/周围注射阻滞疼痛术

患者须知

简介

- 神经根阻滞术用于诊断神经根炎症是否颈部或背部疼痛的原因和确定疼痛的源头。
- 本手术也可用于治疗与神经根疾病相关的疼痛。
- 本手术将由有介入治疗和骨骼肌放射学专业技能的放射科医生负责实施。
- 本术通常在放射科在 X 线透视和 CT 的监视指导下完成。

流程

- 手术进针部位通常会在脊椎旁后侧区域。
- 在无菌的操作下，小孔径针在图像监视系统的指导下插入。
- 令患者产生相同疼痛的神经根会被找出。
- 注射局部麻醉剂到引起疼痛的神经部位。
- 本术亦可为外科手术治疗提供帮助。
- 手术大约需要花时 30-45 分钟。
- 术后无需特殊监护。
- 疼痛改善持续 8-12 周，可能需要重复注射治疗。

可能发生的并发症

并不常见

- 血肿和出血。
- 感染。
- 脊髓动脉供血受损（罕见）。
- 非离子性碘造影剂引起的不良反应发生率低于 0.7%。非离子性造影剂引起的死亡率低于 1/250,000。

声明

本患者须知单张由香港介入放射科医学会编写。本单张的主要作用是提供病人及家属一般须知的数据，并未能全面包括这项介入手术的所有数据，亦并非向阁下提供任何建议或医疗意见。阁下不应依赖本单张的任何资料去作出任何决定或行动。香港介入放射科医学会不会负责任何因利用这病人须知单张而引起之后果及法律责任。在编写单张过程中，负责人员已尽量将最新及准确之资料包括在内。但随着新

的医疗研究结果公布及技术发展，单张内的资料未必能反映最新情况。病人及家属应向你们的主诊医生询问有关这项介入手术的一切疑问。

2010 年编写。版本 2.0